

## Zaštita strnih žita od korova

Osnovna mera za suzbijanje korova u usevima gustog sklopa je primena odgovarajućih herbicida. Većina herbicida se može primenjivati od sredine bokorenja kada su korovi najosetljiviji i kada još nisu naneli štetu usevu. Herbicidi koji se mogu primeniti u ovoj fazi porasta pšenice su herbicidi na bazi 2,4 D **LENTEMUL- D**. Poslednji rok primene Lentemul-a D je do pojave drugog kolenca. Ovaj herbicid dobro deluje na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida (*Cirsium arvense*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), tarčužak obični (*Capsella bursa pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), suncokret samonikli (*Helianthus annuus*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*).

Odlične rezultate u suzbijanju širokolisnih korova daje primena preparata **SARACEN MAX** u dozi od 25 g/ha kada su korovi u fazi razvijena 2-4 lista.

Ako je reč o proizvodnji semenske pšenice ili ako na parceli imamo problematični korov *Gallium aparinae* (prilepaču) preporučujemo primenu herbicida **SECATOR OD** u dozi primene od 0,15 l/ha.