

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

Najveće štete čini na breskvi, a nešto manje na kajsiji i dunji. Kao štetočina lastara, opasan je samo za breskvu.

Breskvin smotavac prezimljava kao odrasla gusenica upredena u kokonu, na stablu i drugim skrovitim mestima. Prvi leptiri se pojavljuju polovinom maja. Ženke nakon parenja odlažu 30-70 jaja, pojedinačno na naličje listova i vrhove lastara. U našim uslovima javljaju se tri potpune generacije štetočine i četvrta delimično. Na breskvi se prve dve generacije razvijaju isključivo na lastarima, a jedan deo gusenica kasnijih generacija napadaju samo plodove.

Suzbija se insekticidima koji imaju kontaktno i digestivno delovanje. Prvo prskanje se obavlja krajem maja, 10-15 dana posle pojave prvih leptira, a kasnije se prska svakih 12-15 dana da bi se zaštitili letorasti. Od polovine jula, radi zaštite plodova, obavljaju se 3-4 tretmana, vodeći računa o vremenu sazrevanja sorti i poslednjim rokovima primene pred berbu.

Preporučeni insekticidi protiv ove štetočine su: **Fastac 10% EC, Gusathion WP-25, Decis 2,5-EC, Zolone liquide** i dr

