

## CRVENI VOĆNI PAUK (*Panonychus ulmi*)

Najčešće napada jabuku i šljivu, ali i druge voćne vrste, čak i vinovu lozu.

Oštećenja od crvenog pauka zapažaju se u vidu sitnih žućkastih mrlja na listovima, koji su nastali usled sisanja sokova. Pri jačem napadu listovi izgube zelenu boju i postaju olovnosivi. Ovo utiče na plodonošenje u sledećoj godini.

Štetočina prezimljava u stadijumu zimskog jajeta na vrhovima grančica, u račvama grana i oko pupoljaka. Piljenje larvi u našim uslovima počinje od polovine aprila, a može i kasnije. Larve prelaze na lišće, pretežno na naličje, gde sišu sokove. Odrasli pauci tu polažu jaja. Svakih dvadesetak dana javlja se nova generacija tako da ih tokom vegetacije ima od sedam do devet.

Suzbijanje počinje pred kraj piljenja larvi iz zimskih jaja, u aprilu ili maju-akaricidima. Kasnija prskanja protiv larvi i odraslih, posle precvetavanja i tokom leta, ako se zato ukaže potreba, drže štetočinu u bezopasnim granicama. Preparati koji se koriste su: **Talstar 10 EC**, **Perfekthion**, **Ortus 5 SC** i dr.

