

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

Jedna je od najopasnijih štetočina jabučastog voća. Izaziva crvljivost plodova. Pored jabuke napada i krušku i dunju, a manje kajsiju, breskvu i druge voćne vrste. Leptir jabučastog smotavca je veličine 2 cm (kada su mu raširena krila). Prednja krila su pepeljasta sa poprečnim krivudavim linijama, a uz sam rub je karakteristična pega sa polumesečastim šarama. Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao gusenica pod korom jabuke i na drugim skrovitim mestima. Krajem maja pojavljuju se leptiri. Posle parenja ženke polažu jaja na lišće, grančice i mlade plodove. Desetak dana kasnije iz jaja se ispile gusenice. Posle kraćeg vremena ubušuju se u plodove, koji su tada veličine lešnika.

Od polovine jula do polovine avgusta javljaju se leptiri prve generacije. Nakon parenja, ženke polažu jaja na plodove, a posle 10-12 dana ispile se gusenice druge generacije i ubušuju se u već razvijene plodove.

Suzbijanje se izvodi uništavanjem gusenica odmah nakon piljenja, a pre ubušivanja u plodove. Obzirom da ženka polaže jaja petnaestak dana, treba koristiti preparate koji imaju duže dejstvo. Protiv svake generacije preporučuju se dva prskanja u razmaku od 12-15 dana.

Insekticidi koji se preporučuju protiv ove štetočine su Anthocid-D, Megathrin 2,5 EC, Mospilan 20 SG, Zolone liquide, Fenitrotion, Ultracid 40 WP i dr.

