

## PROBLEMI I REŠENJA U ZAŠTITI BRESKVE I NEKTARINE

### **KOVRDŽAVOST LISTA ( *Taphrina deformans* )**

Ova gljiva najčešće napada list, a mogu da budu napadnuti mladari, cvet i plod. Zaraženi listovi se kovrdžaju i zadebljavaju, gube zelenu boju i postaju bledozeleni do narandžastocrveni. Zaraženo lišće se suši i opada. *Taphrina* prezimljuje na obolelim voćkama, a njene spore rano u proleće ostvaruju zarazu. Kišovito i prohladno vreme pogoduje razvoju bolesti. Novih zaraza tokom vegetacije nema, što je retka pojava za biljne bolesti. Kovrdžavost lišća se suzbija u rano proleće. Ne treba čekati da se pojavi, zato što je tada kasno za zaštitu.

**SUZBIJANJE:** Tretman se obavlja bakarnim preparatom Cuproxat u količini od 2,5-3,5 l/ha čim pupoljci počnu da bubre i iz njih izbiju spoljni listići. Preporučuje se i tretman u jesen, kada opadne oko 60 % listova.

### **PEPELNICA BRESKVE ( *Sphaerotheca pannosa* )**

Na ovu bolest su naročito osetljive nektarine. Znaci bolesti se javljaju na lišću, plodovima i mladrima u vidu beličaste prevlake. Gljiva prezimljava u obolelim letorastima i pupoljcima, odakle se u proleće raznosi sporama i izaziva zarazu.

**SUZBIJANJE:** Neophodno je sasecati i uništavati obolele letoraste. Hemijsko suzbijanje se obavlja nekim preparatom na bazi sumpora u razmacima od 10-14 dana. Prvo prskanje se obavlja posle pojave prvih simptoma bolesti.

### **ZELENA BRESKVINA LISNA VAŠ ( *Myzus persicae* )**

Veći broj generacija ove štetočine se razvija na lišću i lastarima. Napadnuto lišće se kovrdža, lastari se deformišu, a čitavo stablo je prekriveno lepljivom mednom rosom.

**SUZBIJANJE:** Tretman protiv ove štetočine se obavlja čim se primete prve kolonije vaši, nekim od insekticida koji deluju sistemično npr. Chess 50 WG u koncentraciji 0,03-0,04 %; Perfektion u koncentraciji 0,075-0,10 % i dr.