

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA

U zasadima jabuke , kruške , dunje , usevima soje , suncokreta , šećerne repe ,krompira ,kupusa ,luka I mnogim drugim usevima,rizomski sirak i drugi travni korovi kao što su muhari, pirevina, zubača, divlji proso i drugi ,uspešno se suzbijaju herbicidom **FUSILADE FORTE**.

Vec 30 godina u svetu i 20 godina kod nas u preko 60 zemalja i u preko 40 useva primenjuje se kao selektivni translokacioni herbicid (graminacid) posle nicanja useva i korova ,za suzbijanje jednogodišnjih h (*muhari, proso i dr.*) i višegodnjih (*divlj sirak, pirevina, zubača*)uskolisnih korova . Pri sintezi ovog preparata koristi se *isolink tehnologija* kojom je omogućeno brže i potpunije usvajanje preparata,veća otpornost na spiranje kišom ,brže prenošenje aktivne materije u podzemne organe korova , veća selektivnost za tretirani usev i bolje ekološke karakteristike. Preparat je potpuno selektivan i ne izaziva nikakve promene na gajenim biljkama , koje su u velikom broju slučajeva tolerantne i prema tri puta većoj količini primenjenog preparata. Ovo je najselektivniji herbicid za suzbijanje uskolisnih korova u svim povrtarskim usevima. Lišće veoma brzo usvaja preparat –već jedan sat nakon primene a padavine nakon ovog perioda nemaju nikakav uticaj na delovanje i efikasnost preparata. Aktivna materija se posle usvajanja transportuje do mesta delovanja ,a to su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnih (stablo ,list) i podzemnih delova (koren i rizomi). Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi intezivnog porasta (10-15 cm visine),odnosno obavezno pre klasanja i cvetanja korova kada korovi zbog prestanka porasta postaju znatno otporniji na translokacione herbicide kao što je **FUSILADE FORTE**.

FUSILADE FORTE se primenjuje u količini od **0,8 l/ha** za suzbijanje jednogodišnjih i **1,3 l/ha** višegodišnjih uskolisnih korova . Utrošak vode ne bi trebao da prelazi 300 l /ha. Korov prestaje sa rastom 1-2 dana nakon primene i više ne konkuriše usevu . Simptomi delovanja herbicida **FUSILADE FORTE** vidljivi su nakon 5 - 7 dana od tretiranja u vidu crvenila lišća korova i postepenog uvenuća. Posle 2-3 nedelje dolazi do potpunog propadanja divljeg sirka i drugih travnih korova. Najmanje 10 dana od tretiranja ne obavljati obradu zemljišta ili mehaničko uništavanje korova da bi se omogućilo da dovoljna količina preparata dospe u podzemne organe višegodišnjih korova .

Simptomi delovanja herbicida Fusilade forte na divlji sirak



2 dana nakon tretmana

1 nedelju nakon tretmana

3 nedelje nakon tretmana