

## SUZBIJANJE KOROVA U SUNCOKRETU

Uskoro će nastupiti vreme setve suncokreta. Pored dobre pripreme zemljišta i setve obavljene u optimalno vreme, neophodno je zaštititi useva od korova.

Dobri efekti postižu se primenom odgovarajućih herbicida nakon setve, a pre nicanja useva i korova. U tu svrhu može se primeniti herbicid **OKSIFEN 240 EC**. Ako se primeni sam preparat, doza primene je 1-1,25 l/ha. Ovaj herbicid suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su štir, pepeljuga, tatula, poligonumi, pomoćnica, gorušica, mišjakinja i dr. Takođe suzbija višegodišnje širokolisne korove kao što je poponac njivski. Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove, **OKSIFEN 240 EC** se može primeniti u kombinaciji sa preparatima na bazi metolahlora i to u količini od 1 l/ha + 3 l/ha preparata na bazi metolahlora. Tretman posle setve, a pre nicanja useva i korova, može se obaviti i drugim herbicidima.

Herbicidi na bazi acetohloro – **DELTACET** i acetohloro sa protektantom - **DELTACET PLUS**, deluju na muharike, divlji sirak iz semena, korovsko proso, a primenjuju se u količini 2 – 2,5 l/ha. Za suncokret, posejan na njivama, na kojima pored uskolisnih korova dominiraju korovi kao što su kereće grožđe, gorušica, pepeljuga, štir i abutilon poželjna je kombinacija sa herbicidom na bazi flurohloridona - **SPRINTER 25 EC** u količini od 2 l/ha.

Ova kombinacija pruža zaštitu useva u fazama nicanja i početnog rasta kada su oni najosetljiviji na štetno dejstvo korova. Korovi najviše utiču na smanjenje prinosa baš u ovim prvim fazama razvoja useva, konkurišući im za životni prostor oduzimajući usevu vodu i hranljive materije. Kod suncokreta je vrlo važno suzbiti širokolisne korove pre nicanja suncokreta jer je izbor preparata za njihovo suzbijanje nakon nicanja vrlo mali. Zbog toga je neophodno odabrati kvalitetne herbicide čijom primenom će se postići željeni efekat.

Problem pojave divljeg sirka iz rizoma rešićemo primenom herbicida **FUSILADE FORTE** na bazi fluazifop-P-butila, u dozi od 1,3 l/ha, primenom kada je divlji sirak visine 15-20 cm. Nakon izvesnog vremena od tretmana, divlji sirak počinje da menja boju lista do potpuno crvene, a rizomi se suše i propadaju. Kultiviranje suncokreta ne treba obavljati sve dok se ne utvrdi da su se rizomi divljeg sirka osušili.