

ZAŠTITA SOJE OD KOROVA

Primena herbicida u soji treba da omogući eliminaciju korovskih biljaka tokom cele vegetacije. Da bi se to postiglo, potrebno je napraviti dobar izbor herbicida koji će eliminisati uskolisne i širokolisne korove u soji. Soja je dosta osetljiva na herbicide, pa je potrebna veća pažnja pri njihovoj upotrebi.

Tretmani se mogu izvesti posle setve, a pre nicanja useva i korova kombinacijom herbicida **DELTA CET** (1,8-2,2 l/ha)+ **TRIBUTE 70-DF** (0,4-0,5 kg/ha). Ovom kombinacijom se postiže suzbijanje korova kao što su: gorušica, korovsko proso, muhari, divlji sirak iz semena, štirevi, ambrozija, pepeljuga, divlja mrkva, pomoćnica, abutilon i dr. Za dobro delovanje ovih herbicida neophodno je da padne oko 10 l/m² kiše.

Nakon nicanja useva i korova, kada soja formira 1-3 troliske, po potrebi, izvode se korektivni tretmani protiv korova. Herbicidi za ovu namenu koji daju odlične efekte u primeni su: **PIVOT** (0,8-1 l/ha) za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova; **OXON 75 -WG** (0,08-0,1 kg/ha) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova; **BASAGRAN** (3-4 l/ha) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova; **PROMONI 75-WG** (8 gr/ha+ okvašivač **TREND-90** (0,1 %) za suzbijanje jednogodišnjih korova i **FUSILADE FORTE** (1-1,3 l/ha) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

U proizvodnji se, kod zakorovljenih njiva, u zavisnosti od spektra korova, odlično pokazala kombinacija pomenutih herbicida kao što je npr. **PIVOT** (0,5 l/ha) + **OXON 75-WG** (0,06 kg/ha) + **PROMONI 75-WG** (8gr/ha) + okvašivač **TREND 90** (0,1%) i **FUSILADE FORTE** (1,3 l /ha).