

## Suzbijanje višegodišnjih korova posle žetve strnih žita

---

Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su divlji sirak, pirevina, poponac i palamida često su zastupljeni na našim parcelama.

Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati nicanje korova, putem ljuštenja strništa i sačekati 15 dana da korovi niknu u što većem broju. Kada korovi budu u fazi četiri do šest listova, neophodno je uraditi tretman neselektivnim (totalnim) herbicidima na bazi glifosata u količini 3 do 10 l/ha, u zavisnosti od vrste korova.

Ako na strništu imamo prisutan samo sirak, možemo primeniti od 4 do 5 l/ha nekog glifosata, međutim ako pored ovog korova imamo pirevinu, palamidu i poponac količina preparata mora biti 8 l/ha.

Tretiranu površinu strništa ne treba obrađivati 2 do 3 nedelje posle primene kako bi se herbicid što bolje transportovao preko lista do korena i rizoma. Tretiranje bi trebalo izvoditi u večernjim časovima.

Ovakvim tretmanom oslobađamo parcelu veoma problematičnih i limitirajućih korova za naredni usev, osim što je ovaj način najefikasniji, on je ujedno i ekonomski najisplativiji, a za pojedine vrste korova jedini put njihovog suzbijanja.

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu.