

## Zaštita strnih žita od korova

---

Osnovna mera za suzbijanje korova u usevima gustog sklopa je primena odgovarajućih herbicida. Većina herbicida se može primenjivati od sredine bokorenja kada su korovi najosetljiviji i kada još nisu naneli štetu usevu. Herbicidi koji se mogu primeniti u ovoj fazi porasta pšenice je herbicid **LENTEMUL D** na bazi aktivne materije 2,4-D. Poslednji rok primene **LENTEMUL D** je do pojave drugog kolenca. Ovaj herbicid dobro deluje na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida (*Cirsium arvense*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), tarčužak obični (*Capsella bursa pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), suncokret samonikli (*Helianthus annuus*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*).

Odlične rezultate u suzbijanju širokolisnih korova daje primena preparata **SARACEN MAX** u dozi od 25 g/ha kada su korovi u fazi razvijena 2-4 lista. Ako na parceli imamo problematični korov prilepaču (*Gallium aparinae*) **SARACEN MAX** je herbicid koji efikasno suzbija ovaj korov, kao i palamidu, poponac i ambroziju. Primenjuje se do zastavičara.

**Sekator OD** se primenjuje u usevu **pšenice i ječma** u količini od **0,15 l/ha** od faze 3 lista pa do pojave zastavičara, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). **Sekator OD** je efikasan u suzbijanju: jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova, kao i višegodišnjih širokolisnih korova: palamida njivska (*Cirsium arvense*).